



Laboratorio
Enologico
Toscano

Eno Advance srls

Via dei Gelsi, 39 – 53036 Poggibonsi (SI)

Tel +39 0577 979149

info@enoadvance.com

www.laboratorioenologicotoscano.it



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

non contiene OGM e/o organismi patogeni

ANTIMYC

Attivatore dei meccanismi naturali di difesa
a base di *B. subtilis*, *B. licheniformis*, *B. amyloliquefacens*,
Trichoderma harzianum

ANTIMYC favorisce i naturali meccanismi di difesa nelle colture suscettibili a *Botritis cinerea*, *Monilia* e *Marciume acido*; attiva i processi enzimatici ed i processi ISR (Induced Systemic Resistance); in condizioni ambientali idonee agisce in poche ore dalla distribuzione in campo, il range di temperatura ottimale è 18-28°C; in caso di piogge entro le 24-36 ore dalla distribuzione, si consiglia di ripetere l'applicazione.

Dosi e modalità di impiego

ANTIMYC può essere utilizzato per via fogliare, in fertirrigazione o localizzato; interventi ogni 7-15 gg in funzione delle esigenze colturali e dell'andamento climatico.

Colture	Dose/hL	Dose/ha minima	Note
Ortaggi in serra	200-350 g	2,00 kg	200 g/1000 m ² in fertirrigazione
Ortaggi a pieno campo	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione
Drupacee e piccoli frutti	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione
Pomacee e actinidia	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione
Vite	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione
Agrumi	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione
Colture industriali	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione
Tabacco	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione
Floricole e ornamentali	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione
Tappeti erbosi	250-400 g	2,50 kg	3 kg/ha in fertirrigazione

Compatibilità - Avvertenze

ANTIMYC è compatibile con tutti i concimi, insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi ad esclusione di prodotti a reazione fortemente acida o alcalina. ANTIMYC è compatibile anche con i prodotti rameici, si consiglia comunque di distanziarne l'applicazione di 48 ore per non rallentare la sua azione. Si consiglia comunque di effettuare dei saggi per verificare la compatibilità prima dell'impiego. Utilizzare nelle ore più fresche. Impiegare volumi di acqua sufficienti a garantire la corretta ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Rispettare le avvertenze riportate in etichetta.

Composizione caratterizzante	Etichettatura	Consentito in agricoltura biologica
Micorrize (<i>glomus</i> spp.) 0,005 %	Prodotto ad azione specifica inoculo di funghi micorrizici	Regolamento CE 889/2008 Annex 1
Batteri della rizosfera (<i>B. subtilis</i> , <i>B. licheniformis</i> , <i>B. amyloliquefacens</i>) 10 ⁸ UFC/g	Formulazione: liquido	Non contiene OGM
<i>Trichoderma harzianum</i> 10 ² UFC/g	Confezioni da: Flacone 250 g, 1 kg Tanica 5 kg	