



ANTIMYC

Activo Rame

Activo Mn-Zn



L.E.T. srl

Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) - Tel +39 0577 979149 Fax +39 0577 978023 – let@letservice.it www.laboratorioenologicotoscano.it



ANTIMYC

Attivatore dei meccanismi naturali di difesa
a base di *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*,
Trichoderma harzianum



ANTIMYC favorisce i naturali meccanismi di difesa nelle colture suscettibili a *Botritis cinerea*, *Monilia* e Marciume acido; attiva i processi enzimatici ed i processi **ISR** (Induced Systemic Resistance); in condizioni ambientali idonee agisce in poche ore dalla distribuzione in campo, il range di temperatura ottimale è 18-28°C; in caso di piogge entro le 24-36 ore dalla distribuzione, si consiglia di ripetere l'applicazione.

Dosi e modalità di impiego

ANTIMYC può essere utilizzato per via fogliare, in fertirrigazione o localizzato; interventi ogni 7-15 gg in funzione delle esigenze colturali e dell'andamento climatico.

Colture	Dose/hl	Dose/ha minima	Note
Ortaggi	250-350 g	2,00 kg	3,50 kg/ha in fertirrigazione
Frutticole	250-400 g	2,50 kg	4,00 kg/ha in fertirrigazione
Vite	250-400 g	2,50 kg	4,00 kg/ha in fertirrigazione
Aromatiche	250-350 g	2,00 kg	3,50 kg/ha in fertirrigazione
Floricole e ornamentali	250-350 g	2,00 kg	3,50 kg/ha in fertirrigazione
Tappeti erbosi	250-400 g	2,50 kg	4,00 kg/ha in fertirrigazione

Compatibilità - Avvertenze

ANTIMYC è compatibile con tutti i concimi, insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi ad esclusione di prodotti a reazione fortemente acida o alcalina. **ANTIMYC** è compatibile anche con i prodotti rameici, si consiglia comunque di distanziarne l'applicazione di 48 ore per non rallentare la sua azione. Si consiglia comunque di effettuare dei saggi per verificare la compatibilità prima dell'impiego. Utilizzare nelle ore più fresche. Impiegare volumi di acqua sufficienti a garantire la corretta ed uniforme bagnatura della vegetazione. Rispettare le avvertenze riportate in etichetta.

Composizione caratterizzante	Etichettatura	Consentito in agricoltura biologica
Micorrize (<i>glomus</i> spp.) 0,005%	Prodotto ad azione specifica – inoculo di funghi micorrizici	Regolamento CE 889/2008 Annex 1
Batteri della rizosfera (<i>B.Subtilis</i> , <i>B.Licheniformis</i>) 10 ⁸ CFU/g	Formulazione: liquido	Non contiene OGM
<i>Trichoderma Harzianum</i> 10 ⁶ UFC/g	Confezioni da: Flacone 1 kg Tanica 5 kg e 20 kg	

L.E.T. srl

Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) - Tel +39 0577 979149 Fax +39 0577 978023 – let@letservice.it www.laboratorioenologicoscano.it



Activo Rame



Attivatore dei meccanismi naturali di difesa
a base di rame a basso dosaggio

Activo Rame contiene rame complessato con aminoacidi caratterizzati da elevate proprietà chelanti. Questa associazione ha numerosi vantaggi quali **elevata efficienza** e **azione sistemica**, che permettono l'azione dello ione rameico anche nei vasi conduttori floematici e xilematici, ridotta dose di rame metallo, immediata ripresa della coltura.

Il complesso aminoacidico a base di glicina, prolina e alanina, stimola la biosintesi della clorofilla, l'emissione di nuove foglie e interviene sui meccanismi di resistenza della pianta in situazioni avverse.

Activo Rame ha la capacità di stimolare le naturali difese della pianta e contestualmente migliorare i processi vegetativi.

Dosi e modalità di impiego

Activo Rame può essere utilizzato: per via fogliare; fertirrigazione; localizzato.

Interventi ogni 7-15 gg in funzione delle esigenze colturali e dell'andamento climatico.

Colture	Dose/hl	Dose/ha minima	Note
Ortaggi	130-150 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Drupacee e piccoli frutti	130-200 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Pomacee e actinidia	150-200 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Vite	150-200 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Olivo	150-250 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Agrumi	150-250 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Colture industriali	130-200 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Tabacco	150-250 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Floricole e ornamentali	100-150 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione
Tappeti erbosi	150-250 g	1,00 kg	2 kg/ha in fertirrigazione

Compatibilità - Avvertenze

Activo Rame è compatibile con tutti i concimi, insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi ad esclusione di polisolfuri, fosfati, prodotti a reazione alcalina, e prodotti ormonici. Si consiglia comunque di effettuare dei saggi per verificare la compatibilità sulle colture prima dell'impiego. Utilizzare nelle ore più fresche. Non superare le dosi consigliate. Impiegare volumi di acqua sufficienti a garantire la corretta ed uniforme bagnatura della vegetazione. Su drupacee, alcune varietà di melo, pero ed altre colture cuprosensibili in piena vegetazione, oppure su tutte le colture durante la fioritura, si consiglia l'impiego solo dopo aver saggiato l'assenza di fenomeni di fitotossicità.

Composizione caratterizzante	Etichettatura:	Consentito in agricoltura biologica
Rame (Cu) solubile in acqua 5% (60g/L)	Concime CE - soluzione di concime a base di rame (solfato)	Regolamento CE 889/2008 Annex 1
	Formulazione: liquido	
	Confezioni da: Flacone 1 kg Tanica 5 kg	

L.E.T. srl

Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) - Tel +39 0577 979149 Fax +39 0577 978023 - let@letservice.it - www.laboratorioenologicotoscano.it



Activo Mn-Zn



Attivatore dei meccanismi naturali di difesa

A base di Manganese e Zinco

In presenza di lesioni, necrosi ed altre alterazioni della vegetazione, dovuti ad infezioni fungine, come *Alternaria*, *Antracnosi*, *Cercosporiosi*, *Marciume nero*, *Peronospora*, *Ruggine*, *Septoria* e *Ticchiolatura*, l'impiego di **Activo Mn-Zn** consente alle piante di superare gli stress biotici e abiotici, mantenendo di conseguenza ottimali le performance produttive.

Dosi e modalità di impiego

Activo Mn-Zn agendo rapidamente, può essere utilizzato in condizioni ambientali favorevoli alle infezioni;

Activo Mn-Zn viene assorbito in 4-5 ore, quindi, in caso di pioggia, dopo questo intervallo di tempo non si deve ripetere l'intervento; la sua efficacia si mantiene per cinque giorni. Agisce per contatto e una volta assorbito dalla pianta esplica una mobilità translaminare e parzialmente sistemica.

Colture	Dose/hl	Dose/ha minima	Note
Ortaggi da frutto (solanacee)	300-500 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Ortaggi da frutto (cucurbitacee)	200-350 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Ortaggi a foglia, erbe fresche	200-300 g	2,50 kg	Ogni 7-14 giorni
Ortaggi a radice, bulbo, stelo	250-300 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Fragola	250-400 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Drupacee, pomacee e actinida	250-400 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Piccoli frutti	250-400 g	3,00 kg	Ogni 6-12 giorni
Vite	300-500 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Olivo	500-600 g	4,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Agrumi	300-500 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Barbabietole, cereali	250-400 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Tabacco	250-400 g	3,00 kg	Ogni 7-14 giorni
Floricole e ornamentali	200-300 g	3,00 kg	Ogni 6-12 giorni
Tappeti erbosi	200-300 g	3,00 kg	Ogni 6-12 giorni

Compatibilità - Avvertenze

Activo Mn-Zn è compatibile con tutti i concimi, insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi ad esclusione di prodotti a reazione alcalina. Evitare miscele con Oli, Bagnanti ionici, Poltiglia bordolese, prodotti contenenti Calcio. Si consiglia comunque di effettuare dei saggi per verificare la compatibilità sulle colture prima dell'impiego. Utilizzare nelle ore più fresche. Non superare le dosi consigliate. Impiegare volumi di acqua sufficienti a garantire la corretta ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Composizione caratterizzante	Etichettatura:	Consentito in agricoltura biologica
Manganese (Mn) chelato EDTA 3% Zinco (Zn) chelato EDTA 1% Carrier autoregolante di origine vegetale 3%	Concime CE - miscela liquida di microelementi Manganese (Mn EDTA) e (Zn EDTA)	Regolamento CE 889/2008 Annex 1
	Formulazione: liquido	
	Confezioni da: Flacone 1 kg Tanica 5 kg	

L.E.T. srl

Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) - Tel +39 0577 979149 Fax +39 0577 978023 - let@letservice.it - www.laboratorioenologicotoscano.it